



# PERI-OPERATIEF MEDICATIEBELEID:

---

*Wat te doen met thuismedicatie in de peri-operatieve periode?*

# CARDIO-VASCULAIRE MEDICATIE:

## Bèta-BLOKKERS

Behandeling verderzetten, inclusief op de dag van de ingreep

# CARDIO-VASCULAIRE MEDICATIE:

## Alpha-2 AGONISTEN

( Clonidine of Catapressan®; Methyldopa of Aldomet®)

Behandeling verderzetten, inclusief op de dag van de ingreep

# CARDIO-VASCULAIRE MEDICATIE:

## CALCIUMKANAAL-BLOKKERS

### DIHYDROPYRIDINES

(Amlor® , Amlogal® , Adalat® , Baypress® , Cleviprex® , Hypan® , Lomir® , Plendil® , Sular® , Syscor® , Vasexten® , Zanidip® ,,,,,)

VERAPAMIL (Lodixal® , Isoptine®)

DILTIAZEM (Progor® , Tildiem®)

Behandeling verderzetten, inclusief op de dag van de ingreep

# CARDIO-VASCULAIRE MEDICATIE:

## ACE-INHIBITOREN

(Accupril® , Capoten® , Captopril® , Coversyl® , Enalapril® , Fosinil® , Inhibace® , Lisinopril® , Mariper® , Perindopril® , Quinapril® , Ramipril® , Tritace® , Zopranol® ...)

INDICATIE IS ARTERIELE HYPERTENSIE



STOP ACE-inhibitor  
avond pre-opertief

INDICATIE IS HARTFALEN



Gemiddelde bloeddrukwaarden  
(HA, thuismeting, raadpleging,...)  
zijn eerder LAAG



STOP ACE-INHIBITOR DAG VAN OK

NEEN



# CARDIO-VASCULAIRE MEDICATIE:

## AT-II receptor-INHIBITOREN

(Aprovel® , Atacand® , Belsar® , Bespres® , Cozaar® , Diovane® , Kinzalmono® ,  
Loortan® , Micardis® , Olmetec® , Teveten® , .....)

INDICATIE IS ARTERIELE HYPERTENSIE



STOP ACE-inhibitor  
avond pre-opertief

INDICATIE IS HARTFALEN



Gemiddelde bloeddrukwaarden  
(HA, thuismeting, raadpleging,...)  
zijn eerder LAAG



STOP ACE-INHIBITOR DAG VAN OK

NEEN



# CARDIO-VASCULAIRE MEDICATIE:

## DIURETICA

Kaliumverliezende diuretica

(Chloortalidon® , Fludex® , Indapamide® ,  
Burinex® , Lasix® , Torrem®)

Kaliumsparende diuretica

(Aldactone® , Inspra® , Spironolactone®)

**Behandeling verderzetten, NIET op de dag van heerkunde**

# CARDIO-VASCULAIRE MEDICATIE:

## STATINES

(Atorasat® , Atorvastatine, Cholemed® , Crestor® ,Lescol® , Lipitor® , Prareduct® ,  
Pravasine® , Pravastatine, Rosuvastatine, Simvastatine, Totalip® , Zocor® ,...)

**Behandeling verderzetten, inclusief op de dag van de ingreep**



# CARDIO-VASCULAIRE MEDICATIE:

## DIGOXINE en METHYLDIGOXINE

(Lanoxin®, Lanitop®)

Nog slechts weinig gebruikt!

Kan gebruikt worden bij:

VKF met snel ventriculair antwoord in kader van “rate control”

VKF met symptomatisch hartfalen

Ernstig hartfalen en onvoldoende antwoord op andere farmaca

Meestal behandeling verderzetten, overleg met anaesthesie

# GASTRO-INTESTINALE MEDICATIE:

## H<sub>2</sub>-ANTIHIISTAMINICA

(Acidine®, Ranitidine, Zantac®.)

Behandeling verderzetten, inclusief op de dag van de ingreep

# GASTRO-INTESTINALE MEDICATIE:

## PROTONPOMP-INHIBITOREN

(Acidcare® , Acidozol® , Brandocare® , Dakar® , Esomeprazol, Ippracid® ,  
Lansoprazol, Losec® , Maalox Control® , Nexiam® , Omeprazol, Pantogastrix® ,  
Pantomed® , Pantozol, Pariet® , Sedacid® , )

Behandeling verderzetten, inclusief op de dag van de ingreep

# PULMONALE MEDICATIE:

## INHALATIE BRONCHODILATOREN

### BETA-2-MIMETICA

Kortwerkende

(Aeromir® , Novolizer Salbutamol® , Ventolin® )

Langwerkende

(Foradil® , Oxis® , Onbrez® , Serevent® , Striverdi® ,...)

### ANTICHOLINERGICA

Kortwerkende

(Atrovent® )

Langwerkende

(Bretaris® , Seebri® , Spiriva® , Incruse® ,...)

### COMBINATIEPREPARATEN

Kortwerkende

(Combivent® , Duovent® , Nebu-lprasal® )

Langwerkende

(Anoro® , Duaklir® , Spiolto® , Ultibro® ,...)

**Behandeling verderzetten, inclusief op de dag van de ingreep**

# PULMONALE MEDICATIE:

Theofylline

(Xanthium®)

**STOP avond voor de ingreep**

# PULMONALE MEDICATIE:

## LEUKOTRIEENRECEPTORANTAGONIST

(Montelukast, Singulair®)

Behandeling verderzetten, inclusief op de dag van de ingreep

# PSYCHOTROPE MEDICATIE:

## TRICYCLISCHE ANTIDEPRESSIVA

(Redomex® , Anafranil® , Tofranil® , Prothiaden® , Noritrielen® , Ludiomil® )

Behandeling verderzetten verhoogt risico op ritmestoornissen perioperatief.  
Behandeling abrupt stoppen resulteert in slapeloosheid, misselijkheid,  
hoofdpijn, hypersalivatie en diaphoresse.

Behandeling verderzetten, inclusief op de dag van de ingreep

# PSYCHOTROPE MEDICATIE:

## TRICYCLISCHE ANTIDEPRESSIVA

(Redomex® , Anafranil® , Tofranil® , Prothiaden® , Noritrielen® , Ludiomil® )

Behandeling verderzetten verhoogt risico op ritmestoornissen perioperatief.  
Behandeling abrupt stoppen resulteert in slapeloosheid, misselijkheid,  
hoofdpijn, hypersalivatie en diaphoresse.

Behandeling verderzetten, inclusief op de dag van de ingreep



# PSYCHOTROPE MEDICATIE:

SSRI's en SNRI's

Behandeling verderzetten, inclusief op de dag van de ingreep

# PSYCHOTROPE MEDICATIE:

## BENZODIAZEPINES

Behandeling verderzetten, inclusief op de dag van de ingreep

# PSYCHOTROPE MEDICATIE:

## LITHIUM

(Camcolit®, Maniprex®)

Behandeling verderzetten, inclusief op de dag van de ingreep

# MEDICATIE BIJ PARKINSON

(Prolopa® , Duodopa® , Mirapexin® , Pramipexol® , Sifrol® , Requip® , Ropinirol® , Neupro® , Parlodel® ,...)

Behandeling verderzetten, inclusief op de dag van de ingreep